


Кампания «Пережить сепсис»: Рекомендации по лечению критически больных взрослых с коронавирусом COVID-19



COVID-19 Resources

Рекомендации по лечению критически больных взрослых с коронавирусом

COVID-19 с легкими проявлениями ОРДС



НЕОБХОДИМО:

Vt (ДО) 4-8 мл/кг, P_{plat} <30 см H₂O



НЕОБХОДИМО:

обследовать на наличие бактериальной инфекции



НЕОБХОДИМО:

целевое SpO₂ 92-96%



РАССМОТРЕТЬ:

консервативную стратегию инфузионной терапии



РАССМОТРЕТЬ:

эмпирическая терапия антибиотиками



ПОД ВОПРОСОМ:

системные кортикостероиды

COVID-19 с ОРДС от умеренной до тяжелой формы



РАССМОТРЕТЬ:

более высокое ПДКВ



РАССМОТРЕТЬ:

болюсное введение НМБ для целей содействия вентиляции



РАССМОТРЕТЬ: В СЛУЧАЕ ОТВЕТА НА ПДКВ

стандартные рекрутирующие маневры



РАССМОТРЕТЬ:

вентиляция в положении лежа на животе на 12-16 ч



РАССМОТРЕТЬ: при высоком P_{plt} асинхронии в положении лежа на животе инфузию НМБ продолжительностью 24 часа



НЕЛЬЗЯ:

маневры рекрутмента со ступенчатым повышением ПДКВ



РАССМОТРЕТЬ:

короткий курс системных кортикостероидов



ПОД ВОПРОСОМ:

противовирусные, Хлорохин, анти интерлейкин-6

Резервная/вспомогательная терапия



ПОД ВОПРОСОМ:

противовирусные, Хлорохин, анти-ИЛ6



РАССМОТРЕТЬ: при высоком P_{plt} асинхронии в положении лежа на животе инфузию НМБ продолжительностью 24 часа



РАССМОТРЕТЬ:

вентиляция в положении лежа на животе на 12-16 ч



РАССМОТРЕТЬ: ПРЕРВАТЬ в случае отсутствия быстрого ответа пробно - ингаляция оксида азота



РАССМОТРЕТЬ: согласно местным критериям в отношении ЭКМО
Вено-венозная экстракорпоральная мембранная оксигенация или направление в центр по ЭКМО

ОРДС (ARDS) - острый респираторный дистресс-синдром
P_{plat} - давление плато
SpO₂ - насыщенность кислородом при периферийных капиллярах
ПДКВ (PEEP) - положительное давление в конце выдоха
НМБ (NMBA) - нервномышечные блокаторы
ЭКМО (ECMO) - экстракорпоральная мембранная оксигенация